

سوالات استخدامی

موارد ویژه

(اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)

آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی و کلیدی

TSNA.ir

اخطار: هرگونه فروش، بازنشر، یا استفاده غیرقانونی از این فایل، از جمله تغییر در لوگو، آرم یا محتوای آن، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. متخلفان علاوه بر پاسخگویی در برابر مراجع قانونی، تحت تعقیب حقوقی قرار می گیرند.

توجه:

این نمونه سوالات استخدامی بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سوالات این بسته بصورت رایگان ارائه شده است. برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمایید.

۱. بهترین اقدام مناسب برای بیمار دچار هایپرترمی کدام است؟ (آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۴۰۲)

- (۱) اسپری آب ۱۵ درجه و استفاده از فن
- (۲) اسپری آب ۲۵ درجه و استفاده از فن
- (۳) اسپری آب سرد و استفاده از فن
- (۴) قرار دادن کیسه یخ در دست و پا و صورت بیمار

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۱: گزینه ۱ صحیح است.

- اسپری آب ولرم (۱۵ درجه): آب خیلی سرد می تواند باعث انقباض عروق و کاهش سرعت خنک سازی بدن شود.
- آب ولرم به طور مؤثرتری باعث تبخیر و کاهش دمای بدن می شود.
- استفاده از فن: جریان هوا به تبخیر سریع تر آب از سطح پوست کمک کرده و فرآیند خنک سازی را تسریع می کند.

۲. خانه ۲۴ ساله باردار در هفته ۳۱ بارداری دچار سردرد شدید و درد اپیگاستر شده است. حین انتقال به بیمارستان دچار تشنج تونیک کلونیک می شود. موثرترین درمان برای پیشگیری از تشنج های بعدی در این بیمار کدام است؟ (آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۴۰۲)

- (۱) دیازپام
- (۲) فنی توئین
- (۳) بی کربنات سدیم
- (۴) سولفات منیزیم

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۲: گزینه ۴ صحیح است.

بیمار زن باردار ۳۱ هفته ای با سردرد، درد اپیگاستر و تشنج تونیک-کلونیک است که نشان دهنده اکلامپسی می باشد. اکلامپسی یک عارضه خطرناک پره اکلامپسی است که با افزایش فشار خون، پروتئینوری و تشنج همراه است. درمان اصلی و خط اول: سولفات منیزیم، که به عنوان داروی ضد تشنج انتخابی در اکلامپسی استفاده می شود، زیرا:

- ☒ فعالیت سیستم عصبی مرکزی را کاهش می دهد.
- ☒ از بروز تشنج های بیشتر جلوگیری می کند.
- ☒ نسبت به دیازپام و فنی توئین در این شرایط ارجحیت دارد.

۳. کودک ۵ ساله ای متعادل گزش زنبور دچار تورم صورت و لبها، تنگی نفس، تهوع، درد شکم و دیسترس تنفسی شده است اقدام مناسب کدام گزینه است؟ (آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۴۰۲)

(۱) اپی نفرین ۰/۲ میلی گرم عضلانی (۲) اپی نفرین ۰/۵ میلی گرم عضلانی

(۳) هیدروکورتیزون وریدی (۴) درمان های حمایتی

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۳: گزینه ۱ صحیح است.

این کودک با توجه به علائم ذکر شده (تورم صورت و لبها، تنگی نفس، تهوع، درد شکم و دیسترس تنفسی) دچار یک واکنش آنافیلاکسی شدید ناشی از گزش زنبور است. اپی نفرین (آدرنالین) درمان خط اول و نجات بخش در آنافیلاکسی است و باید بلافاصله تجویز شود.

دوز اپی نفرین برای کودکان: ۰/۰۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر ۰/۳ میلی گرم) به صورت عضلانی در ناحیه خارج ران (موسلوس و استوس لترالیس) تزریق می شود. برای یک کودک ۵ ساله با وزن متوسط (حدود ۲۰ کیلوگرم)، دوز مناسب ۰/۲ میلی گرم است.

۴. خانمی به دنبال زایمان، یک ساعت قبل دچار تداوم خونریزی واژینال شده است. با توجه به فاصله حدود یک ساعته تا مرکز درمانی کدام اقدام زیر درست نمی باشد؟ (آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۴۰۲)

(۱) جستجوی بقایای جفتی در رحم (۲) چک واژن با گاز استریل

(۳) تزریق نرمال سالین (۴) اقدامی لازم ندارد

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۴: گزینه ۴ صحیح است.

با توجه به تداوم خونریزی واژینال پس از زایمان، این وضعیت می تواند ناشی از علل مختلفی از جمله بقایای جفت، آتون رحم یا پارگی های زایمانی باشد و نیاز به مداخله فوری دارد. اقدام نادرست در این شرایط، گزینه ۴) اقدامی لازم ندارد، است. خونریزی پس از زایمان، به ویژه اگر مداوم باشد، می تواند خطرناک باشد و نباید نادیده گرفته شود.

اقدامات مناسب در این شرایط:

- جستجوی بقایای جفتی در رحم: این اقدام برای اطمینان از خروج کامل جفت و جلوگیری از خونریزی های بعدی ضروری است.
- چک واژن با گاز استریل: این کار به منظور بررسی وجود پارگی های احتمالی و ارزیابی میزان خونریزی انجام می شود.
- تزریق نرمال سالین: تزریق نرمال سالین برای جبران حجم خون از دست رفته و حفظ فشار خون بیمار ضروری است.

۵. در کنترل بیمار دچار اختلال رفتاری و روانی در صورت نیاز به ایجاد مهار فیزیکی کدام گزینه صحیح نیست؟

(آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۴۰۲)

(۱) استفاده از مهار کننده عریض و چرمی

(۲) ایجاد محدودیت فیزیکی فقط با استفاده از دست و پا

(۳) کنترل علائم حیاتی هر ۱۵ دقیقه

(۴) قرار دادن بیمار در وضعیت Prone

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۵: گزینه ۴ صحیح است.

در بیماران دچار اختلالات رفتاری و روانی که نیاز به مهار فیزیکی دارند، رعایت اصول ایمنی بیمار بسیار مهم است. قرار دادن بیمار در وضعیت دمر (Prone) خطرناک است زیرا می‌تواند باعث:

- ✗ انسداد راه هوایی و افزایش خطر خفگی
- ✗ فشار بیش از حد به قفسه سینه و اختلال در تنفس
- ✗ افزایش ریسک مرگ ناگهانی در بیماران با وضعیت روانی ناپایدار

۶. به دنبال تماس تلفنی با بالگرد به منطقه کوهستانی اعزام شده‌اید. آقای ۲۷ ساله‌ای را ویزیت می‌کنید که به دنبال گزش میچ دست، با نیش مار با ۱۱۵ تماس گرفته است. مار را کشته اند و شکل آن را مشاهده می‌کنید. همراهان بالای آرنج وی را محکم با باند بسته‌اند، به نحوی که جریان خون قطع شده است. شما نیم ساعت تا مرکز درمانی فاصله دارید. بیمار علامتی به جز اضطراب و تپش قلب ندارد، کدام اقدام مناسب است؟

(آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۱۴۰۲)



(۱) باز کردن تورنیکه و اتل دست و قرار دادن دست زیر قلب

(۲) با حفظ تورنیکه در طول اعزام

(۳) باز کردن تورنیکه و بستن بانداز الاستیک به جای آن

(۴) مار سمی نیست و اقدام خاصی جزء اطمینان دهی لازم نیست.

برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمائید.

TSNA.ir